

IMAGEN

Recibido: Octubre 2014. Aceptado: Noviembre 2014

Enfisema subcutáneo difuso secundario a hernioplastia inguinal abierta Diffuse subcutaneous enphysema due to open inguinal hernia repair

L. M. Merino Peñacoba, J. Ortiz de Solórzano, J. González Perea, J. Beltrán de Heredia

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Autor para correspondencia: merinocirujano@yahoo.com

Varón de 21 años, sometido hace 24 horas a hernioplastia inguinal ambulatoria (técnica de Lichtenstein). Acude a urgencias por dolor abdominal. Tras la exploración se solicitó una prueba de imagen abdominal (tomografía computarizada). Esta mostraba gran enfisema subcutáneo de toda la pared abdominal hasta el reborde costal (Figuras 1 y 2). Se intervino de forma urgente, realizando disección del tejido celular subcutáneo, lavado abundante y colocación de drenajes, y se instauró antibioterapia empírica evolucionando favorablemente.

Los dos cultivos del exudado y los hemocultivos resultaron negativos.

El enfisema subcutáneo está claramente definido como complicación tras la realización de hernioplastia laparoscópica.

No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica que refiera esta complicación en la hernioplastia abierta.




Fig. 1.




Fig. 2.